Arysta LifeScience

ڈائی تھین ایم-45

80 فیصد ڈبلیو پی

Active Ingredients:

Mancozeb:..... 80% (w/w)

Inert Materials:..... 20% (w/w) (Balance to make 100%)

RAINSHIELD Technology

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں

- بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں
- حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ● استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- کوئی مخصوص تریاق نہیں ● ڈاکٹر کے زیگرانی علامات کے مطابق علاج کرائیں

زہر خطرہ

قدرے خطرناک

Mode of Action:

GROUP M03 FUNGICIDE

پھپھوندی کش زہر

(صرف زرعی استعمال کے لیے)

1 کلوگرام

DITHANE® M-45

80% WP

ڈائی تھین ایم 45 آزمودہ وسیع الاثر زہر ہے۔ جو بہت سی نفع آور پھل و سبزیات کو اگیتا جھلساؤ، پچھیتا جھلساؤ اور رئیں دار پھپھوندی سے موثر تحفظ فراہم کرتا ہے۔ **ڈائی تھین ایم** 45 کے اجزا پر چپکنے کی خصوصی صلاحیت کی بنا پر ہلکی بارش اور شبنم سے اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ اسے فصل کے کسی بھی مرحلے پر مکمل اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماریاں	مقدار استعمال	وقفہ برائے برداشت	REI	ہدایت
آلو	اگیتا جھلساؤ اور پچھیتا جھلساؤ	600 گرام فی ایکڑ	14 دن	24 گھنٹے	بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہی اسپرے کریں۔ حملے کی شدت میں حسب ضرورت 5 سے 7 دن کے وقفے سے دُہرائیں۔
		800 گرام فی ایکڑ	6 دن		
		800 گرام فی ایکڑ	7 دن		
ٹماٹر، کھیرا، گلکدو، دودھی	رئیں دار پھپھوندی	800 گرام فی ایکڑ	14 دن		
تربوز، خربوزہ، کدو، کریلا	رئیں دار پھپھوندی	800 گرام فی ایکڑ	14 دن		
دیگر سبزیاں	رئیں دار پھپھوندی	800 گرام فی ایکڑ	7 دن		

نوٹ: زیر بارشی کے کم از کم ایک دن یا فصل کے خشک ہونے تک داخل نہ ہوں۔

بیماریوں پر موثر کنٹرول کے لئے جیسے ہی موسم بیماریوں کیلئے سازگار ہو تو حفاظتی اسپرے کا طریقہ اپنائیں۔ بیماری نظر آنے کا انتظار نہ کریں جب بیماری کی علامات نظر آتی ہیں تو فصل کا پیداواری نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا سفارشات عمومی ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ہمارے زرعی ماہرین سے رجوع کریں۔

احتیاطی تدابیر: زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء خوراک، غیر متعلقہ لوگوں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل پیکنگ میں بند، ٹھنڈی، خشک اور ہوادار جگہ میں اسٹور کریں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (مثلاً ایپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء مثلاً چشمہ، دستانے، ہیٹ اور بوٹ ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ لگنے دیں اور سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد ہاتھ اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آبپاشی کے رائج میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کے خالی پیکٹوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں تو زکر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پہلے کریں اور منہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر بارشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کریں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

ابتدائی طبی امداد: اگر زہر کا کوئی حصہ در جو آلودہ ہو جائے تو متاثر کپڑے اتار دیں اور زہر آلودہ حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر دوا آنکھوں میں چلی جائے تو آنکھوں کو 15 منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زہر نگلنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو قے کروائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو کوئی مائع نہ پلائیں۔ مریض کو تاز ہوا میں رکھیں اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

اسٹوریج: **ڈائی تھین ایم** 45 کو اصل سربمہر پیکنگ میں سورج کی روشنی اور آگ سے دور ٹھنڈی اور ہوادار جگہ پر اسٹور کریں۔ اسٹور کھانے پینے کی اشیاء سے علیحدہ بچوں اور جانوروں کی پہنچ سے دور ہو۔ اس میں تالا لگا ہو اور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھنے پائے۔ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زہر کو مقررہ معیاد تک اسٹور کیا جا سکتا ہے۔

زہر قربانی کے علامات: **ڈائی تھین ایم** 45 سے آنکھوں، ناک، گلے اور جلد پر خارش کا احتمال ہے۔ **ڈائی تھین ایم** 45 ڈیڈی کھی کیلئے مضر ہے۔

ماحول اور جنگلی حیاتیات: آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور راجباہوں کو بوری آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات، مچھلیوں کی جائے افزائش اور گھریلو استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔

اشتراک: **ڈائی تھین ایم** 45 کو انگلی کے آمیز اور ٹرائیکو کے مرکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار دوں اور ایکیلمو مدی کش زہروں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ متائی حالات میں کسی طبی ماہر یا زراعت دان کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔

گارنٹی: چونکہ زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ زہر کو تیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ دوائی میں دی گئی شرائط کا مظہر رکھا جائے۔

انتباہ برائے استعمال کنندگان: تیار کنندگان زہر کے معیاری ہونے کی اسی صورت میں ضامن ہیں جب زہر کو سفارش کردہ طریقہ کار کے مطابق وقیرہ اور استعمال کیا جائے اور زہر اس کے اصل سربمہر پیکنگ میں ہو۔ زہر کے غلط استعمال اور دیگر مجرمانہ نتیجہ تیار کنندگان کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں، سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار استعمال کنندہ ہوگا۔

Registration No.: PAK / APO / 47 / 74

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metaled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0C° and above 35C° But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Imported & Distributed By:
Arysta LifeScience Pakistan (Pvt.) Ltd.
3rd floor, Building No. 5/A, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75350, Pakistan
Tel: (+92-21) 34522611-3 ArystaLifescienceIqbal www.uqi-ltd.com/pk

Manufactured & Formulated By:
M/s. Laoting Yoloo Bio-Technology Co., Ltd.
No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development Zone, Hebei Province, 063600, P.R. China.

Packed By: (Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan (Pvt.) Ltd.)