

سکسیسیس


سکسیسیس ایک وسیع الاثر پھپھوندی کش زہر ہے۔ جس کا اصل زہر چبوتوں میں جذب ہو کر اور چپک کر مختلف فصلوں اور سبزیات کو لمبے عرصے کے لئے بیماریوں کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے اور بہتر نشوونما کے ساتھ پیداوار معیار اور منافع میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ سکسیسیس دوطاقتور ادویات کا کچھ ہونے کی بدولت بیماری کی دوا کے خلاف قوت مدافعت روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے اور استعمال میں آسان ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار کنیکری انیکر	پراختیہ ہفتے	REI	ضروری ہدایات
خربوزہ، کھجور، تربوز وغیرہ (Cucurbits) <td>رومیں دار پھپھوندی (Downy Mildew) <td>200 سے 250 گرام <td>7 دن <td>24 گھنٹے <td>فصل پر اسپرے حفظ ماقدم ایجادی کے لئے مطابق ہدایت پڑھو اور پھر شروع کریں اور سبب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے ان طریقہ کریں کہ پودوں کے عمول سے ٹھیک طرح تک جائیں۔</td> </td></td></td></td>	رومیں دار پھپھوندی (Downy Mildew) <td>200 سے 250 گرام <td>7 دن <td>24 گھنٹے <td>فصل پر اسپرے حفظ ماقدم ایجادی کے لئے مطابق ہدایت پڑھو اور پھر شروع کریں اور سبب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے ان طریقہ کریں کہ پودوں کے عمول سے ٹھیک طرح تک جائیں۔</td> </td></td></td>	200 سے 250 گرام <td>7 دن <td>24 گھنٹے <td>فصل پر اسپرے حفظ ماقدم ایجادی کے لئے مطابق ہدایت پڑھو اور پھر شروع کریں اور سبب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے ان طریقہ کریں کہ پودوں کے عمول سے ٹھیک طرح تک جائیں۔</td> </td></td>	7 دن <td>24 گھنٹے <td>فصل پر اسپرے حفظ ماقدم ایجادی کے لئے مطابق ہدایت پڑھو اور پھر شروع کریں اور سبب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے ان طریقہ کریں کہ پودوں کے عمول سے ٹھیک طرح تک جائیں۔</td> </td>	24 گھنٹے <td>فصل پر اسپرے حفظ ماقدم ایجادی کے لئے مطابق ہدایت پڑھو اور پھر شروع کریں اور سبب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے ان طریقہ کریں کہ پودوں کے عمول سے ٹھیک طرح تک جائیں۔</td>	فصل پر اسپرے حفظ ماقدم ایجادی کے لئے مطابق ہدایت پڑھو اور پھر شروع کریں اور سبب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے ان طریقہ کریں کہ پودوں کے عمول سے ٹھیک طرح تک جائیں۔

اشتہارک: سکسیسیس کو الٹکی کے آمیزے اور تانے کے مرکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پھپھوندی کش ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ مقامی حالات میں انکی طبعی آمیزش اور فصل پر اثرات و نتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔

Reg.No. REG(ABROAD) / DPP / 2003 / (1002)



احتیاطی تدابیر: زہر کو چھوچھو کی تیختی سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی شیان، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو کامل ٹیکٹس میں بندھنی خشک اور ہوا دار جگہ میں اسٹور کریں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (حشائے ایل، وغیرہ) اور دوسری اشیا (جیک، دستا، گولف بوت) ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کا کچھ جلد یا کپڑوں پر نہ پڑے۔ اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور گھرنے توڑنی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد ہاتھیں اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آٹھائی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کے خالی ڈبوں کو پرکڑ گھریلے استعمال میں نہ لائیں۔ آٹھائی توڑ کر آٹھائی اور پینے کی پانی کے ذرائع سے دور زمین میں باندیں۔ بوالہی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کھام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر پاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلود ہونے کی صورت میں تبدیل کریں اور صاف سے اچھی طرح دھو لیں۔

اسٹورج: سکسیسیس کو اصل سر بمبر ٹیکٹ میں سورج کی روشنی، نمی اور دھوک سے دور رکھنی اور ہوا دار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے پینے کی شیان، پیٹھ دھوچوں اور جانوروں کی تیختی سے دور ہوساں میں تالا لگا دوں اور دہر حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھنے پائے۔ تانے سے بڑھ طریقے کے مطابق دوا کو مضرہ معیاد تک اسٹور کیا جا سکتا ہے۔

ماحول اور جنگلی حیاتیات: آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور راجا ہوں کو زہری آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات و پھلیوں کی جانے افزائش کو گھریلے استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place. Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & insulated floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 5°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instructions, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

پھپھوندی کش زہر (صرف زرعی استعمال کے لئے)

72 فیصد ڈیلیوپی

سکسیسیس

72% WP
SUCCESS



زہر
قدرے خطرناک

- بچوں کی تیختی سے دور رکھیں
- حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں
- استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- کوئی مخصوص تریاق نہیں
- ڈاکٹر کے زیر نگرانی علامات کے مطابق علاج کرانیں

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں

Ingredients:
Chlorothalonil.....64% W/W (640 gm/kg)
Metalaxyl..... 08% W/W (80 gm/kg)
Others.....28% W/W (280 gm/kg)

NET CONTENT

1 کلو گرام

ابتدائی طبی امداد:

اگر جسم کا کوئی حصہ زہر آلود ہو جائے تو متاثرہ کپڑے اتار دیں اور دوا آلود حصے کو سانس اور پانی سے اچھی طرح دھو لیں اگر دوا آنکھوں میں چلی جائے تو آنکھوں کو 15 منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اگر چہلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوا کی لٹکنی کی صورت میں متاثرہ شخص کو کھانے پینے سے روکیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو کوئی ماٹھے چیر نہ چلائیں۔ سر میں کتا زہر دواؤں میں رکھیں اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

گازنی:

چیکو زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ ختمدار کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ دوا کو تیار کی کے بعد سے 2 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ وراثی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔

سکسیسیس پھپھوندی کش خطرناک ہے جبکہ شہد کی مکھوں کیلئے معمولی خطرناک ہے۔

Manufactured & Formulated By:
Ms. Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co. Ltd.,
Liandu Road, Houjing Village, Yanjiang Industrial Area,
Wenzhou, Zhejiang, China

Packed By:
M/s. United Distributors Pakistan Ltd.,
Plot No. 231, Sector 7A, Korangi Industrial Area, Karachi
(Under Supervision of Arysta LifeScience Pakistan)

دراوڈ تھیمہ کنڈنگان

آریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

تحریک بلڈنگ نمبر 5/A، پٹی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس،
بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔
فون: 3-4522611-13 (21-92+)
www.upl-ltd.com/pk