

20 فیصد ایس سی

# تاگومی

جاپانی تاگومی آیا۔۔۔

لشکری اور امریکن سنڈی کا ہوا موثر اور دیرپا صفایا




اڈیٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

طاقتور **تاکومی** جاپان سے درآمد شدہ زہر ہے جس کا مؤثر عنصر فلوبینڈامائیڈ (Flubendamide) ہے۔ جو اپنے منفرد طریقہ اثر کی بدولت دوسرے مرکبات کے خلاف مدافعت رکھنے والی لشکری اور امریکن سنڈیوں کا بھی مؤثر اور دیرپا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

## کا منفرد طریقہ اثر:

## تاکومی

کیٹیشیم پٹھوں کے باہمی تعامل اور مضبوطی کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ **تاکومی** دوسرے کیڑے مارز ہروں کے برعکس کیڑوں کے پٹھوں (Muscles) میں موجود ریانوڈائن ریسیپٹرز (RyR) پر اثر انداز ہو کر کیٹیشیم کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے نتیجتاً **تاکومی** کے اسپرے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد سنڈیاں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور 3 سے 7 گھنٹے کے دوران یہ میں مکمل صفایا۔



# سنڈی کا ہوا موثر اور دیرپا صفایا



## کی نمایاں خصوصیات:

## تا کومی

تا کومی اسپرے کے بعد پتوں کی اوپر والی سطح میں کافی حد تک جذب ہو جاتی ہے۔ جس کی بدولت بارش کے بعد بھی اسکی افادیت برقرار

تا کومی کے اسپرے سے فصل سرسبز و شاداب اور کوئی اسپٹس نہیں

تا کومی وسیع الاثر سنڈی مارزہر

تا کومی منفرد طریقہ اثر کی بدولت، دیرپا اور موثر کنٹرول

تا کومی دوسرے مرکبات کے خلاف مدافعت رکھنے والی سنڈیوں کے خلاف بھی موثر

تا کومی میں لمسی اثر اور اسپرے شدہ پتوں میں جذب ہونے کی صلاحیت

تا کومی پتوں کے نیچے چھپی ہوئی سنڈیوں کے خلاف بھی موثر

تا کومی ماحول دوست، فصل دوست، دہرا تحفظ

تا کومی کسان دوست کیڑے محفوظ-IPM پروگرام میں معاون

تا کومی کپاس، گوبھی، پھول گوبھی اور ٹماٹر میں نہایت کامیابی سے استعمال



تا کومی سے اسپرے شدہ



غیر اسپرے شدہ

## استعمال کے لئے سفارشات:

فصل	کیڑے	مقدار فی ایکڑ	وقفہ برائے برداشت
کپاس	لشکری سنڈی، ہیلپو تھس	120 ملی لیٹر	25 دن
گوبھی / پھول گوبھی	ڈائمنڈ بیک ماتھ	70 ملی لیٹر	2-3 دن

(استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں)

## زرعی زہروں کا ذمہ دارانہ استعمال ... ہماری صحت اور ماحول کا تحفظ



صحیح طریقہ سے ہیرے کریں اور ہوا کی مخالف سمت  
اوپر سے کریں۔



کھانے پینے یا تباہی پھینک کر تے وقت ہرگز اہر سے کریں۔



اہر سے کے وقت حفاظتی کپڑے (اپرین) اور دوسری اشیاء  
(جنگ دھاتے لوگ بوت) خردور استعمال کریں۔



زہر کھانے پینے کی چیزوں سے ٹیبلو دور رکھیں۔



زہر کو بچان کی کچھ سے دور حفاظت سے لیں۔



استعمال سے پہلے لیبل پڑھی ہوئی بات غور سے پڑھیں  
اور اس پر عمل کریں۔



زہر کا اثر ہو جانے کی صورت میں فوری طبی امداد حاصل کریں  
اور زہر کو کھلے ہوا کو کھڑو رکھیں۔



اگر زہر جسم پر لگ جائے تو کپڑے اتار دیں اور تھوکر  
سانے سے اچھی طرح دھو لیں۔



تقلیل حمل کے دوران زہر کو سفاروں اور کھانے پینے کی  
اشیاء سے دور رکھیں۔



آپنی کڑکھوں کو زہریلی چیزوں سے آلودہ نہ کریں۔



استعمال کے بعد زہریلی چیزوں کے خالی ڈبوں اور بوتلوں کو  
کھلیں اور آبی کڑکھوں سے دور رکھیں اور آہستہ آہستہ میں  
جاریں یا زہریلی چیزیں نہ کریں۔



زہر کے خالی ڈبوں کو پانی یا کھانے پینے کی چیزوں  
کیلئے استعمال نہ کریں۔

مزید معلومات کیلئے **آرڈیسیٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ** کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس: تھرڈ فلور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون: (+92-21) 34522611-3

ریجنل آفس: لاہور: 042-37513154 • ملتان: 061-6537315-18 • حیدرآباد: 022-3880103 • پشاور: 091-2964529

f Arystalifesciencepk

www.upl-ltd.com/pk